

**Mohs
Klinieken.**

**Uw zorg
in ervaren
handen.**



Dordrecht

Spuiboulevard 226
3311 GR Dordrecht
+31 (0)78 632 10 80
+31 (0)78 632 10 81
contact@mohsklinieken.nl

Amsterdam

Zwaansvliet 5
1081 AP Amsterdam
+31 (0)20 820 11 95
+31 (0)20 820 21 86
contactamsterdam@mohsklinieken.nl

Hoorn

Maelsonstraat 26
1624 NP Hoorn
+31 (0)229 820 256
+31 (0)229 820 257
contactnh@mohsklinieken.nl

www.mohsklinieken.nl



November 2023

Excisie (het wegsnijden van een huidafwijking)



Mohs Klinieken. Specialisten in huidkanker.

Excisie (het wegsnijden van een huidafwijking)

In deze informatiefolder wordt uitgelegd hoe de ingreep verloopt, wat de te verwachten resultaten en de mogelijke risico's zijn en beschrijft enkele leefregels voor de periode na de ingreep.

Wat is het

Huidafwijkingen kunnen op diverse manieren worden verwijderd. Een van de meest toegepaste vormen is de excisie. Hierbij wordt de huid met de afwijking weggesneden en gehecht.

Hoe verloopt de ingreep

De ingreep (excisie) gebeurt in de behandelkamer. U neemt plaats in een comfortabele operatiestoel. Wordt u behandeld in het gelaat, gebruik dan geen make-up.

Er wordt samen met u het juiste plekje aangewezen. Na het ontsmetten van de huid wordt plaatselijke verdoving gegeven.

Dit kan gevoelig zijn. De dermatoloog snijdt het stukje huid weg. Mogelijk worden er enkele bloedvatjes dichtgeschroeid.

Nadien wordt er gehecht. Dit kan door de wondranden eenvoudig samen te brengen. Indien dit niet mogelijk is, zal er huid van elders gebruikt worden; dit kan door huid te schuiven, of door het van een

andere plaats te transplanteren.

Soms wordt het defect niet gesloten en laten we het spontaan genezen. Welke techniek gekozen wordt, gebeurt in overleg met u. Daarna wordt de wond verbonden.

Het resultaat

Na iedere ingreep ontstaat er een litteken. Hoe dit eruit komt te zien, hangt af van de plaats waar geopereerd wordt, uw eigen genezingsaanleg en de operatietechniek.

Bent u niet tevreden over het uiteindelijke resultaat, neem dan contact op met de arts en deze zal samen met u naar een oplossing zoeken.

De risico's

Het risico op een ernstige complicatie is minimaal. Indien u allergisch bent voor verdovingsvloeistof, dient u dat steeds te melden.

Nabloeding

Er komt bloed onder het verband uit. Duw met de vlakke hand gedurende 30 minuten continu stevig op het verband. Indien het bloeden niet stopt, duwt u opnieuw 30 minuten op het verband, zonder los te laten.

Indien het blijft bloeden, neemt u dan contact met ons op.

“Het litteken is nauwelijks te zien.”

Infectie

Begint na enkele dagen het geopereerde gebied pijn te doen, ziet het rood of krijgt u koorts, neemt u dan contact met ons op.

Enkele leefregels voor na de operatie

- Doe rustig aan; til geen zware zaken, buk niet naar voren, doe niet aan sport, vermijd fors zweten.
- Indien u pijn heeft, kunt u paracetamol innemen. Neem geen aspirine of acetylsalicylzuur.
- Maak het verband niet nat! Dit verhoogt de kans op infecties.
- Laat het verband 2-3 dagen droog, daarna mag het verband eraf en mag u het geopereerde gebied met water spoelen.
- Indien u in het gelaat geopereerd bent, kunt u het beste de eerste nacht slapen met het hoofdeind iets omhoog.

Tot slot

Als u zich na de behandeling ergens zorgen over maakt, kunt u contact opnemen met Mohs Klinieken.

Bij een noodgeval, 's avonds of in het weekend, kunt u contact met ons opnemen via het meegegeven spoednummer.

Excisie bij kinderen en tieners

De leefregels voor na de operatie gelden ook voor kinderen en tieners. Voor meer informatie over huidaandoeningen bij kinderen en tieners verwijzen wij u naar de website www.huidhuis.nl.